

Scala di valutazione dell'aggressività nel soccorso pre-ospedaliero

Aggressività verbale/ comunicativa – x1	<ul style="list-style-type: none"> nessuna aggressività verbale rush cutaneo, respiro ed eloquio accelerato, risposte taglienti o caustiche, sarcasmo, aumento del tono della voce
	<ul style="list-style-type: none"> aumento della gestualità, urla con rabbia minacce violente contro gli altri e/o contro sé stesso
	<ul style="list-style-type: none"> minacce violente e resistenza all'assistenza sanitaria
Aggressività contro proprietà – x2	<ul style="list-style-type: none"> nessun agito
	<ul style="list-style-type: none"> sbatte le porte e strappa gli indumenti sbatte oggetti a terra, calci ai mobili
	<ul style="list-style-type: none"> rompe oggetti attitudine pantoclastica
Autoaggressività – x3	<ul style="list-style-type: none"> nessun gesto autodiretto
	<ul style="list-style-type: none"> colpisce il proprio corpo senza riportare lesioni rivolge il corpo verso l'ambiente circostante (sbatte la testa contro il muro, tira pugni contro le pareti, si butta per terra)
	<ul style="list-style-type: none"> colpisce il proprio corpo riportando lesioni colpisce il proprio corpo riportando lesioni gravi o azioni anticonservative
Eteroaggressività – x4	<ul style="list-style-type: none"> nessun agito
	<ul style="list-style-type: none"> accorciamento delle distanze, spintonamenti, afferra gli abiti colpisce le persone senza provocare lesioni colpisce le persone provocando lesioni lievi (contusioni, lividi) colpisce le persone provocando lesioni gravi (fratture, tagli profondi)